



EPILEPSI,

Ideopatisk epilepsi förekommer i rasen

Inom rasen finns epilepsi i flera linjer över nationsgränserna. Inom den svenska populationen finns ett fåtal individer med konstaterad epilepsi samt ett antal närbesläktade till dessa.

Forskningsrön visar att idiopatisk epilepsi vanligen inträffar mellan 15 - 28 månaders ålder.

Idiopatisk epilepsi kan inte konstateras med blodprov eller DNA-test. Det är enbart tiden som utvisar om en individ är anlagsbärare. Det är flera olika gener som samverkar i arvgången och därför har inte det genetiska sambandet genetiskt kunnat kartläggas.

Ingen avel får ske på sjuka individer enligt SKK:s grundregler. Ingen avel bör ske på närbesläktade individer såsom hel- och halvsyskon förrän de uppnått minst 48 månaders ålder, förutsatt att inga ytterligare fall konstateras bland de närbesläktade. Föräldradjur och kullsyskon rekommenderas att inte användas ytterligare i avel. Endast individer som anses ha ett stort avelsvärde för populationens fortlevnad bör komma ifråga efter karenstidens utgång för avel efter konsultation med rasklubbens avelsråd.

Idiopatisk epilepsi är en allvarlig sjukdom och det är viktigt att samtliga ägare och uppfödare tar ansvar för att inte sjukdomen sprids. För att förebygga förekomsten av epilepsi har rasklubben tagit fram en avelsrekommendation. I de fall du har fler frågor om epilepsi är du välkommen att kontakta rasklubbens avelsråd.

Inom sektorn för Avel- och hälsa ses idiopatisk epilepsi som en reell risk mot rasen. Rasklubben har påbörjat en kartläggning av individer och samarbetar internationellt.